

「阿扶平」農藥使用方法及其範圍

中華民國 115 年 5 月 29 日農授防字第 1151877374E 號公告修正

50 g/L (5% w/v) 阿扶平 水分散性乳劑 (DC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
番茄	粉蝨類	0.7-1 公升	1,200	害蟲發生時開始施藥。	7	共 2 次		6		
甜椒	粉蝨類	0.7-1 公升	1,200	害蟲發生時開始施藥。	7	共 2 次		6		
辣椒	粉蝨類	0.7-1 公升	1,200	害蟲發生時開始施藥。	7	共 2 次		6		
茄子	粉蝨類	0.7-1 公升	1,200	害蟲發生時開始施藥。	7	共 2 次		6		
枸杞	粉蝨類	0.7-1 公升	1,200	害蟲發生時開始施藥。	7	共 2 次		6		
香瓜茄	粉蝨類	0.7-1 公升	1,200	害蟲發生時開始施藥。	7	共 2 次		6		
樹番茄	粉蝨類	0.7-1 公升	1,200	害蟲發生時開始施藥。	7	共 2 次		6		
胡瓜	粉蝨類	0.67-1 公升	1,200	害蟲發生時開始施藥。	7	共 2 次		3		
洋香瓜	粉蝨類	0.67-1 公升	1,200	害蟲發生時開始施藥。	7	共 2 次		3		
香瓜	粉蝨類	0.67-1 公升	1,200	害蟲發生時開始施藥。	7	共 2 次		3		
苦瓜 絲瓜 冬瓜 南瓜 扁蒲 隼人瓜 越瓜 夏南瓜 西瓜 木鱉果	粉蝨類	0.67-1 公升	1,200	害蟲發生時開始施藥。	7	共 2 次		3		本項新增。