

## 「特安勃」農藥使用方法及其範圍

中華民國 115 年 5 月 29 日農授防字第 1151877374G 號公告修正

480 g/L (48% w/v) 特安勃 種子處理用水懸劑 (FS)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
水稻	瘤野螟						<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 每公斤稻種混拌 1.5 毫升藥劑和 15 毫升水。</li> <li>2. 乾稻種直接與藥劑混拌均勻。</li> <li>3. 混拌藥液之稻種，進行風乾，使藥液完全附著於稻種，再行浸種催芽育苗。</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 使用時添加拌種用樹脂 (Peridia m® EC 104) 2 毫升。</li> <li>2. 與非本藥劑核准範圍作物輪作期間為 30 天，以免蓄積殘留。</li> </ol>	

200 g/L(20% w/v) 特安勃 水懸劑 (SC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
水稻	瘤野螟	0.15 公升	5,000	害蟲發生初期施藥 1 次。				40	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 避免於開花期使用。</li> <li>2. 與非本藥劑核准範圍作物輪作期間為 30 天，以免蓄積殘留。</li> </ol>	
十字花科包葉	夜蛾類	0.07-0.10 公升	10,000	害蟲發生時全				3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 避免於開花期使用。</li> </ol>	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
菜類		升		株施藥1次。					2. 與非本藥劑核准範圍作物輪作期間為30天,以免蓄積殘留。	
結球萵苣	夜蛾類	0.08-0.10公升	10,000	害蟲發生時全株施藥1次。				3	1. 避免於開花期使用。 2. 與非本藥劑核准範圍作物輪作期間為30天,以免蓄積殘留。	
十字花科小葉菜類	夜蛾類	0.06-0.10公升	10,000	害蟲發生時全株施藥1次。				2	1. 避免於開花期使用。 2. 與非本藥劑核准範圍作物輪作期間為30天,以免蓄積殘留。	
十字花科小葉菜類	小菜蛾	0.05公升	10,000	害蟲發生初期施藥1次。				2	1. 避免於開花期使用。 2. 與非本藥劑核准範圍作物輪作期間為30天,以免蓄積殘留。	
不結球萵苣與半結球萵苣	夜蛾類	0.08-0.10公升	10,000	害蟲發生時全株施藥1次。				2	1. 避免於開花期使用。 2. 與非本藥劑核准範圍作物輪作期間為30天,以免蓄積殘留。	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
									蓄積殘留。	
茼蒿	夜蛾類	0.08-0.10 公升	10,000	害蟲發生時全株施藥1次。				2	1. 避免於開花期使用。 2. 與非本藥劑核准範圍作物輪作期間為30天,以免蓄積殘留。	
山茼蒿	夜蛾類	0.08-0.10 公升	10,000	害蟲發生時全株施藥1次。				2	1. 避免於開花期使用。 2. 與非本藥劑核准範圍作物輪作期間為30天,以免蓄積殘留。	
紅鳳菜	夜蛾類	0.08-0.10 公升	10,000	害蟲發生時全株施藥1次。				2	1. 避免於開花期使用。 2. 與非本藥劑核准範圍作物輪作期間為30天,以免蓄積殘留。	
白鳳菜	夜蛾類	0.08-0.10 公升	10,000	害蟲發生時全株施藥1次。				2	1. 避免於開花期使用。 2. 與非本藥劑核准範圍作物輪作期間為30天,以免蓄積殘留。	
芳香萬壽菊	夜蛾類	0.08-0.10 公升	10,000	害蟲發生時全株施藥1次。				2	1. 避免於開花期使用。 2. 與非本藥劑核准範圍	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
									圍作物輪作期間為30天,以免蓄積殘留。	
闊包菊	夜蛾類	0.08-0.10 公升	10,000	害蟲發生時全株施藥1次。				2	1. 避免於開花期使用。 2. 與非本藥劑核准範圍作物輪作期間為30天,以免蓄積殘留。	
枸杞	夜蛾類	0.05-0.10 公升	10,000	害蟲發生時全株施藥1次。				2	1. 避免於開花期使用。 2. 與非本藥劑核准範圍作物輪作期間為30天,以免蓄積殘留。 3. 適用於枸杞葉。	
番茄	夜蛾類	0.05-0.10 公升	10,000	害蟲發生時全株施藥1次。				3	1. 避免於開花期使用。 2. 與非本藥劑核准範圍作物輪作期間為30天,以免蓄積殘留。	
甜椒	夜蛾類	0.05-0.10 公升	10,000	害蟲發生時全株施藥1次。				3	1. 避免於開花期使用。 2. 與非本藥劑核准範圍作物輪作期間為30天,以免	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
									蓄積殘留。	
辣椒	夜蛾類	0.05-0.10 公升	10,000	害蟲發生時全株施藥1次。				3	1. 避免於開花期使用。 2. 與非本藥劑核准範圍作物輪作期間為30天,以免蓄積殘留。	
茄子	夜蛾類	0.05-0.10 公升	10,000	害蟲發生時全株施藥1次。				3	1. 避免於開花期使用。 2. 與非本藥劑核准範圍作物輪作期間為30天,以免蓄積殘留。	
枸杞	夜蛾類	0.05-0.10 公升	10,000	害蟲發生時全株施藥1次。				3	1. 避免於開花期使用。 2. 與非本藥劑核准範圍作物輪作期間為30天,以免蓄積殘留。	
香瓜茄	夜蛾類	0.05-0.10 公升	10,000	害蟲發生時全株施藥1次。				3	1. 避免於開花期使用。 2. 與非本藥劑核准範圍作物輪作期間為30天,以免蓄積殘留。	
樹番茄	夜蛾類	0.05-0.10 公升	10,000	害蟲發生時全株施藥1次。				3	1. 避免於開花期使用。 2. 與非本藥劑核准範圍	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
									圍作物輪作期間為30天,以免蓄積殘留。	
洋蔥 胡蘿蔔 甘藷 蘿蔔 馬鈴薯 薑	夜蛾類	0.05- 0.1公 升	10,000	害蟲發 生時全 株施藥 1次。				7	1. 避免於開花期使用。 2. 與非本藥劑核准範圍作物輪作期間為30天,以免蓄積殘留。	本項新增。
蒜	夜蛾類	0.05- 0.1公 升	10,000	害蟲發 生時全 株施藥 1次。				7	1. 避免於開花期使用。 2. 與非本藥劑核准範圍作物輪作期間為30天,以免蓄積殘留。 3. 適用於蒜頭。	本項新增。
甘藷	夜蛾類	0.08- 0.1公 升	10,000	害蟲發 生時全 株施藥 1次。				2	1. 避免於開花期使用。 2. 與非本藥劑核准範圍作物輪作期間為30天,以免蓄積殘留。 3. 適用於葉用甘藷。	本項新增。

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
薤菜 芫荽 芹菜 菠菜 莧菜 羅勒 紫蘇 仙草 薄荷	夜蛾類	0.08-0.1 公升	10,000	害蟲發生時全株施藥1次。				2	1. 避免於開花期使用。 2. 與非本藥劑核准範圍作物輪作期間為30天，以免蓄積殘留。	本項新增。