

「賜諾特」農藥使用方法及其範圍

中華民國 115 年 8 月 7 日農授防字第 1151877683E 號公告修正

11.7(%) (w/w) 賜諾特 水懸劑 (SC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
小麥	螟蛾類	0.3-1.3公升	1,200	害蟲發生時開始施藥。	7			9		
小麥	夜蛾類	0.3-1.3公升	1,200	害蟲發生時開始施藥。	7			9		
小米	夜蛾類	0.3-0.4公升	3,000	發現幼蟲時開始施藥。	10	2		9		
小米	毒蛾類	0.3-0.4公升	3,000	發現幼蟲時開始施藥。	10	2		9		
玉米	螟蛾類	0.3-1.3公升	1,200	害蟲發生時開始施藥。	7			9		
玉米	夜蛾類	0.33 公升	3,000	於玉米播種後 25-35 天，發現幼蟲時開始施藥，隔 10 天施藥 1 次，連續 2 次；於 50%雄花抽穗時開始施藥，隔 10 天施藥 1 次，連續 2 次，全期計施藥 4 次。		4		9		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
玉米	薊馬類	0.3-0.5 公升	3,200	害蟲發生 時開始施 藥。	7		施藥 時務必將 藥液噴灑 至新葉及 葉鞘部 位。	9	玉米薊馬為 玉米褪綠斑 駁病毒之媒 介昆蟲，應 於玉米幼苗 期防治，以 防止病毒傳 播。	
高粱	螟蛾類	0.3-1.3 公升	1,200	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
高粱	夜蛾類	0.3-1.3 公升	1,200	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
薏苡	螟蛾類	0.3-1.3 公升	1,200	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
薏苡	夜蛾類	0.3-1.3 公升	1,200	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
豆科乾 豆類	螟蛾類	0.4-0.7 公升	1,200	害蟲發生 時開始施 藥。	7	1-2 次		9	避免開花期 使用。	
豆科乾 豆類	夜蛾類	0.4-0.7 公升	1,200	害蟲發生 時開始施 藥。	7	1-2 次		9	避免開花期 使用。	
豆科乾 豆類	毒蛾類	0.4-0.7 公升	1,200	害蟲發生 時開始施 藥。	7	1-2 次		9	避免開花期 使用。	
豆科乾 豆類	薊馬類	0.06-0.1 公升	8,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7	1-2 次		9		
落花生	螟蛾類	0.33 公 升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7	2		9		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
落花生	夜蛾類	0.33 公 升	3,000	幼蟲發生 初期開始 施藥。	7	2		9		
落花生	天蛾類	0.33 公 升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7	2		9		
落花生	毒蛾類	0.33 公 升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7	2		9		
胡麻	薊馬類	0.08-0.2 公升	8,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
十字花 科包葉 菜類	菜心螟	0.45-0.6 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			24	1. 採收前 18 天 停止施 藥 (設 施栽培 24 天)。 2. 避免於 開花時 使用。	
十字花 科包葉 菜類	大菜螟	0.45-0.6 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			24	1. 採收前 18 天 停止施 藥 (設 施栽培 24 天)。 2. 避免於 開花時 使用。	
十字花 科包葉 菜類	夜蛾類	0.45-0.6 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			24	1. 採收前 18 天 停止施 藥 (設 施栽培 24 天)。 2. 避免於	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
									開花時 使用。	
十字花 科包葉 菜類	小菜蛾	0.45-0.6 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			24	1. 採收前 18 天 停止施 藥 (設 施栽培 24 天)。 2. 避免於 開花時 使用。	
十字花 科包葉 菜類	紋白蝶	0.45-0.6 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			24	1. 採收前 18 天 停止施 藥 (設 施栽培 24 天)。 2. 避免於 開花時 使用。	
十字花 科包葉 菜類	毒蛾類	0.45-0.6 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			24	1. 採收前 18 天 停止施 藥 (設 施栽培 24 天)。 2. 避免於 開花時 使用。	
十字花 科包葉 菜類	植食性 瓢蟲類	0.45-0.6 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			24	1. 採收前 18 天 停止施 藥 (設 施栽培 24 天)。 2. 避免於 開花時	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
									使用。	
菊科包 葉菜類	薊馬類	0.03-0.1 公升	8,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
豆科小 葉菜類	螟蛾類	0.4-0.7 公升	1,200	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7	避免於開花 時使用。	
豆科小 葉菜類	夜蛾類	0.4-0.7 公升	1,200	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7	避免於開花 時使用。	
豆科小 葉菜類	毒蛾類	0.4-0.7 公升	1,200	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7	避免於開花 時使用。	
豆科小 葉菜類	薊馬類	0.06-0.1 公升	8,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7		
十字花 科小葉 菜類	菜心螟	0.45-0.6 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12	1. 採收前 6 天停 止施藥 (設施 栽培 12 天)。 2. 避免於 開花時 使用。	
十字花 科小葉 菜類	大菜螟	0.45-0.6 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12	1. 採收前 6 天停 止施藥 (設施 栽培 12 天)。 2. 避免於 開花時 使用。	
十字花 科小葉 菜類	夜蛾類	0.45-0.6 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12	1. 採收前 6 天停 止施藥	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
									(設 施 栽 培 12 天)。 2. 避免於 開花時 使用。	
十 字 花 科 小 葉 菜 類	小菜蛾	0.45-0.6 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12	1. 採收前 6 天停 止施藥 (設 施 栽 培 12 天)。 2. 避免於 開花時 使用。	
十 字 花 科 小 葉 菜 類	紋白蝶	0.45-0.6 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12	1. 採收前 6 天停 止施藥 (設 施 栽 培 12 天)。 2. 避免於 開花時 使用。	
十 字 花 科 小 葉 菜 類	毒蛾類	0.45-0.6 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12	1. 採收前 6 天停 止施藥 (設 施 栽 培 12 天)。 2. 避免於 開花時 使用。	
十 字 花 科 小 葉 菜 類	植食性 瓢蟲類	0.45-0.6 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12	1. 採收前 6 天停 止施藥 (設 施	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
									栽 培 12 天)。 2. 避免於 開花時 使用。	
菊 科 小 葉 菜 類	薊馬類	0.03-0.1 公升	8,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
茄 科 小 葉 菜 類	薊馬類	0.06-0.2 公升	8,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
蔥 科 小 葉 菜 類	薊馬類	0.1-0.3 公升	8,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
葫蘆科 小 葉 菜 類	薊馬類	0.09-0.3 公升	8,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
菠菜	斑潛蠅 類	0.3-0.5 公升	3,200	害蟲發生 時開始施 藥。	7	最多 2 次		6		
豆 科 根 菜 類	螟蛾類	0.4-0.7 公升	1,200	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7	避免開花期 使用。	
豆 科 根 菜 類	夜蛾類	0.4-0.7 公升	1,200	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7	避免開花期 使用。	
豆 科 根 菜 類	毒蛾類	0.4-0.7 公升	1,200	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7	避免開花期 使用。	
豆 科 根 菜 類	薊馬類	0.06-0.1 公升	8,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7		
山藥	薊馬類	0.1-0.2 公升	8,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
牛蒡	薊馬類	0.03-0.1 公升	8,000	害蟲發生 時開始施	7			6		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
				藥。						
茄科根 菜類	薊馬類	0.06-0.2 公升	8,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
蔥科根 菜類	薊馬類	0.1-0.3 公升	8,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
蘆筍	薊馬類	0.1-0.2 公升	8,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
茄科果 菜類	薊馬類	0.06-0.2 公升	8,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
金針	薊馬類	0.1-0.3 公升	8,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
秋葵	薊馬類	0.05-0.3 公升	8,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
瓜菜類	薊馬類	0.09-0.3 公升	8,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
豆菜類	螟蛾類	0.4-0.7 公升	1,200	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7	避免開花期 使用。	
豆菜類	夜蛾類	0.4-0.7 公升	1,200	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7	避免開花期 使用。	
豆菜類	毒蛾類	0.4-0.7 公升	1,200	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7	避免開花期 使用。	
豆菜類	薊馬類	0.06-0.1 公升	8,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7		
瓜果類	斑潛蠅 類	0.32- 0.43 公 升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7	2		15	1. 採收前 9 天 (設施	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
									栽 培 15 天) 停止施 藥。 2. 本 案 試 驗 害 物 為「番 茄 斑 潛 蠅」。	
瓜果類	薊馬類	0.09-0.3 公升	8,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
香蕉	薊馬類	0.1-0.3 公升	3,200	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
木瓜	薊馬類	0.2-0.7 公升	3,200	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
獼猴桃	夜蛾類	0.4-0.8 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
番荔枝	薊馬類	0.2-0.5 公升	3,200	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
酪梨	毒蛾類	0.5-1 公 升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
酪梨	薊馬類	0.4-0.7 公升	3,200	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
紅龍果	薊馬類	0.3-0.5 公升	3,200	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
百香果	毒蛾類	0.4-0.8 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
百香果	薊馬類	0.3-0.5	3,200	害蟲發生	7			12		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
		公升		時開始施藥。						
草莓	夜蛾類	0.4-1 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			6		
草莓	薊馬類	0.1-0.3 公升	8,000	害蟲發生時開始施藥。	7			6		
葡萄	夜蛾類	0.5-0.6 公升	2,000	害蟲發生時施藥 1 次。				18	採收前 12 天停止施藥 (設施栽培 18 天)。	
葡萄	薊馬類	0.3-0.5 公升	3,200	害蟲發生時開始施藥。	7			18	採收前 12 天 (設施栽培 18 天) 停止施藥。	
楊桃	烏羽蛾類	0.4-0.8 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			12		
楊桃	毒蛾類	0.4-0.8 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			12		
楊桃	薊馬類	0.3-0.5 公升	3,200	害蟲發生時開始施藥。	7			12		
蓮霧	薊馬類	0.5-1.0 公升	3,000	害蟲發生時施藥 1 次。				7		
蓮霧	米爾頓絨小蜂	0.5-1.0 公升	3,000	花謝後開始施藥至套袋前。	14			6	避免於開花期施藥。	
番石榴	薊馬類	0.4-0.6 公升	3,200	害蟲發生時開始施藥。	7			7		
桑樹	毒蛾類	0.4-0.8 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			12	勿使用於飼養家蠶之桑樹。	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
荔枝	荔枝細蛾	0.75 公升	2000	花落後 7-10 天開始施藥。	7	最多 3 次		7	避免於開花期使用。	
椪果	夜蛾類	0.5-1 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			12		
椪果	毒蛾類	0.5-1 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			12		
椪果	薊馬類	0.3-0.5 公升	4,000	害蟲發生時開始施藥。	7			12		
楊梅	夜蛾類	0.5-1 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			12		
楊梅	毒蛾類	0.5-1 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			12		
薔薇科 梨果類	薊馬類	0.1-0.8 公升	3,200	害蟲發生時開始施藥。	7			7		
梨	夜蛾類	0.5-1 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			6		
梨	毒蛾類	0.5-1 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			6		
梨	刺蛾類	0.5-1 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			6		
梨	中國梨木蝨	0.24-0.34 公升	5,000	害蟲發生時開始施藥。	7			6		
蘋果	夜蛾類	0.5-0.6 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			6		
蘋果	刺蛾類	0.5-0.6 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			6		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
		公升		時開始施 藥。						
桃	夜蛾類	0.5-1 公 升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
桃	毒蛾類	0.5-1 公 升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
桃	刺蛾類	0.5-1 公 升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
梅	毒蛾類	0.6-0.9 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
李	捲葉蛾 類	0.4-0.8 公升	2,400	害蟲發生 時開始施 藥。	10			7		
李	刺蛾類	0.5-1 公 升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
枇杷	毒蛾類	0.8-1 公 升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
鼠李科 梨果類	夜蛾類	0.4-0.6 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
鼠李科 梨果類	毒蛾類	0.4-0.6 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
鼠李科 梨果類	薊馬類	0.3-0.4 公升	3,200	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7		
柿	夜蛾類	0.5-0.6 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
柿	毒蛾類	0.5-0.6 公升	2,000	害蟲發生 時開始施	7			6		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
				藥。						
柿	刺蛾類	0.5-0.6 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
柿	薊馬類	0.3-0.5 公升	3,200	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7		
柑桔類	夜蛾類	0.5-1.2 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
柑桔類	毒蛾類	0.5-1.2 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
柑桔類	柑桔潛 葉蛾	0.5 公升	4,000	害蟲發生 時，全株 噴射施藥 1 次。				6		
柑桔類	鳳蝶類	0.5-1.2 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
柑桔類	刺蛾類	0.5-1.2 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
柑桔類	薊馬類	0.3-0.6 公升	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
百合	薊馬類	0.1-0.3 公升	8,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
蓮	薊馬類	0.2 公升	8,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
茶	夜蛾類	0.5-1.5 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
茶	毒蛾類	0.5-1.5 公升	2,000	害蟲發生 時開始施	7			12		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
				藥。						
茶	刺蛾類	0.5-1.5公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			12		
茶	小黃薊馬	0.33 公升	3,000	萌芽初期害蟲發生時施藥。				12		
藍莓	薊馬類	0.5 公升	4,000	害蟲發生時開始施藥。	7	共 2 次		10	避免於開花期施用。	本項新增。(主管機關依據農藥管理法第 11 條以公務預算辦理之田間試驗)

5.87(%) (w/w) 賜諾特 水懸劑 (SC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
小麥	螟蛾類	0.6-2.6公升	600	害蟲發生時開始施藥。	7			9		
小麥	夜蛾類	0.6-2.6公升	600	害蟲發生時開始施藥。	7			9		
小米	夜蛾類	0.5-0.8公升	1,500	發現幼蟲時開始施藥。	10	2		9		
小米	毒蛾類	0.5-0.8公升	1,500	發現幼蟲時開始施藥。	10	2		9		
玉米	螟蛾類	0.6-2.6公升	600	害蟲發生時開始施藥。	7			9		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
				藥。						
玉米	夜蛾類	0.625 公 升	1,600	於玉米播 種後 25- 35 天，發 現幼蟲時 開 始 施 藥，隔 10 天施藥 1 次，連續 2 次；於 50%雄花 抽穗時開 始施藥， 隔 10 天 施 藥 1 次，連續 2 次，全 期計施藥 4 次。		4		9		
玉米	薊馬類	0.5-1 公 升	1,600	害蟲發生 時開始施 藥。	7		施藥時 務必將 藥液噴 灑至新 葉及葉 鞘部 位。	9	玉米薊馬為 玉米褪綠斑 駁病毒之媒 介昆蟲，應 於玉米幼苗 期防治，以 防止病毒傳 播。	
高粱	螟蛾類	0.6-2.6 公升	600	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
高粱	夜蛾類	0.6-2.6 公升	600	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
薏苡	螟蛾類	0.6-2.6 公升	600	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
薏苡	夜蛾類	0.6-2.6	600	害蟲發生	7			9		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
		公升		時開始施藥。						
豆科乾 豆類	螟蛾類	0.8-1.4 公升	600	害蟲發生 時開始施 藥。	7	1-2 次		9	避免開花期 使用。	
豆科乾 豆類	夜蛾類	0.8-1.4 公升	600	害蟲發生 時開始施 藥。	7	1-2 次		9	避免開花期 使用。	
豆科乾 豆類	毒蛾類	0.8-1.4 公升	600	害蟲發生 時開始施 藥。	7	1-2 次		9	避免開花期 使用。	
豆科乾 豆類	薊馬類	0.12-0.2 公升	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7	1-2 次		9		
落花生	螟蛾類	0.66 公 升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7	2		9		
落花生	夜蛾類	0.66 公 升	1,500	幼蟲發生 初期開始 施藥。	7	2		9		
落花生	天蛾類	0.66 公 升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7	2		9		
落花生	毒蛾類	0.66 公 升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7	2		9		
胡麻	薊馬類	0.16-0.4 公升	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
十字花 科包葉 菜類	菜心螟	0.9-1.2 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			24	1. 採收前 18 天 停止施 藥 (設 施栽培 24 天)。 2. 避免於 開花時	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
									使用。	
十字花 科包葉 菜類	大菜螟	0.9-1.2 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			24	1. 採收前 18 天 停止施 藥 (設 施栽培 24 天)。 2. 避免於 開花時 使用。	
十字花 科包葉 菜類	夜蛾類	0.9-1.2 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			24	1. 採收前 18 天 停止施 藥 (設 施栽培 24 天)。 2. 避免於 開花時 使用。	
十字花 科包葉 菜類	小菜蛾	0.9-1.2 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			24	1. 採收前 18 天 停止施 藥 (設 施栽培 24 天)。 2. 避免於 開花時 使用。	
十字花 科包葉 菜類	紋白蝶	0.9-1.2 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			24	1. 採收前 18 天 停止施 藥 (設 施栽培 24 天)。 2. 避免於 開花時 使用。	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
十字花 科包葉 菜類	毒蛾類	0.9-1.2 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			24	1. 採收前 18 天 停止施 藥 (設 施栽培 24 天)。 2. 避免於 開花時 使用。	
十字花 科包葉 菜類	植食性 瓢蟲類	0.9-1.2 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			24	1. 採收前 18 天 停止施 藥 (設 施栽培 24 天)。 2. 避免於 開花時 使用。	
菊科包 葉菜類	薊馬類	0.06-0.2 公升	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
豆科小 葉菜類	螟蛾類	0.8-1.4 公升	600	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7	避免於開花 時使用。	
豆科小 葉菜類	夜蛾類	0.8-1.4 公升	600	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7	避免於開花 時使用。	
豆科小 葉菜類	毒蛾類	0.8-1.4 公升	600	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7	避免於開花 時使用。	
豆科小 葉菜類	薊馬類	0.12-0.2 公升	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7		
十字花 科小葉 菜類	菜心螟	0.9-1.2 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12	1. 採收前 6 天停 止施藥 (設 施	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
									栽 培 12 天)。 2. 避免於 開花時 使用。	
十 字 花 科 小 葉 菜類	大菜螟	0.9-1.2 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12	1. 採收前 6 天停 止施藥 (設 施 栽 培 12 天)。 2. 避免於 開花時 使用。	
十 字 花 科 小 葉 菜類	夜蛾類	0.9-1.2 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12	1. 採收前 6 天停 止施藥 (設 施 栽 培 12 天)。 2. 避免於 開花時 使用。	
十 字 花 科 小 葉 菜類	小菜蛾	0.9-1.2 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12	1. 採收前 6 天停 止施藥 (設 施 栽 培 12 天)。 2. 避免於 開花時 使用。	
十 字 花 科 小 葉 菜類	紋白蝶	0.9-1.2 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12	1. 採收前 6 天停 止施藥 (設 施 栽 培	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
									12 天)。 2. 避免於 開花時 使用。	
十字花 科小葉 菜類	毒蛾類	0.9-1.2 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12	1. 採收前 6 天停 止施藥 (設施 栽培 12 天)。 2. 避免於 開花時 使用。	
十字花 科小葉 菜類	植食性 瓢蟲類	0.9-1.2 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12	1. 採收前 6 天停 止施藥 (設施 栽培 12 天)。 2. 避免於 開花時 使用。	
菊科小 葉菜類	薊馬類	0.06-0.2 公升	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
茄科小 葉菜類	薊馬類	0.12-0.4 公升	4,000	害蟲發生 時施藥 1 次。	7			7		
蔥科小 葉菜類	薊馬類	0.2-0.6 公升	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
葫蘆科 小葉菜 類	薊馬類	0.18-0.6 公升	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
菠菜	斑潛蠅 類	0.6-0.9 公升	1,600	害蟲發生 時開始施 藥。	7	最多 2 次		6		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
豆 科 根 菜類	螟蛾類	0.8-1.4 公升	600	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7	避免開花期 使用。	
豆 科 根 菜類	夜蛾類	0.8-1.4 公升	600	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7	避免開花期 使用。	
豆 科 根 菜類	毒蛾類	0.8-1.4 公升	600	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7	避免開花期 使用。	
豆 科 根 菜類	薊馬類	0.12-0.2 公升	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7		
山 藥	薊馬類	0.2-0.4 公升	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
牛 蒡	薊馬類	0.06-0.2 公升	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
茄 科 根 菜類	薊馬類	0.12-0.4 公升	4,000	害蟲發生 時施藥 1 次。	7			7		
蔥 科 根 菜類	薊馬類	0.2-0.6 公升	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
蘆筍	薊馬類	0.2-0.4 公升	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
茄 科 果 菜類	薊馬類	0.12-0.4 公升	4,000	害蟲發生 時施藥 1 次。	7			7		
金 針	薊馬類	0.2-0.6 公升	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
秋 葵	薊馬類	0.1-0.6 公升	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
瓜 菜類	薊馬類	0.18-0.6	4,000	害蟲發生	7			6		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
		公升		時開始施藥。						
豆菜類	螟蛾類	0.8-1.4 公升	600	害蟲發生 時開始施藥。	7			7	避免開花期使用。	
豆菜類	夜蛾類	0.8-1.4 公升	600	害蟲發生 時開始施藥。	7			7	避免開花期使用。	
豆菜類	毒蛾類	0.8-1.4 公升	600	害蟲發生 時開始施藥。	7			7	避免開花期使用。	
豆菜類	薊馬類	0.12-0.2 公升	4,000	害蟲發生 時開始施藥。	7			7		
瓜果類	斑潛蠅 類	0.6-0.8 公升	1,600	害蟲發生 時開始施藥。	7	2		15	1. 採收前 9 天 (設施 栽培 15 天) 停止施 藥。 2. 本案試 驗害物 為「番 茄斑潛 蠅」。	
瓜果類	薊馬類	0.18-0.6 公升	4,000	害蟲發生 時開始施藥。	7			6		
香蕉	薊馬類	0.2-0.6 公升	1,600	害蟲發生 時開始施藥。	7			12		
木瓜	薊馬類	0.3-1.3 公升	1,600	害蟲發生 時開始施藥。	7			12		
獼猴桃	夜蛾類	0.8-1.6 公升	1,000	害蟲發生 時開始施	7			12		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
				藥。						
番荔枝	薊馬類	0.4-1 公 升	1,600	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
酪梨	毒蛾類	1-2 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
酪梨	薊馬類	0.7-1.3 公升	1,600	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
紅龍果	薊馬類	0.5-1 公 升	1,600	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
百香果	毒蛾類	0.8-1.6 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
百香果	薊馬類	0.5-1 公 升	1,600	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
草莓	夜蛾類	0.5-1.3 公升	1,600	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
草莓	薊馬類	0.2-0.6 公升	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
葡萄	夜蛾類	1-1.2 公 升	1,500	害蟲發生 時施藥 1 次。				18	採收前 12 天停止施藥 (設施栽培 18 天)。	
葡萄	薊馬類	0.5-1 公 升	1,600	害蟲發生 時開始施 藥。	7			18	採收前 12 天 (設施栽 培 18 天)停 止施藥。	
楊桃	烏羽蛾 類	0.8-1.6 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
楊桃	毒蛾類	0.8-1.6	1,000	害蟲發生	7			12		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
		公升		時開始施藥。						
楊桃	薊馬類	0.5-1 公升	1,600	害蟲發生時開始施藥。	7			12		
蓮霧	薊馬類	0.7-2.0 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			7		
蓮霧	米爾頓絨小蜂	1.0-2.0 公升	3,000	花謝後開始施藥至套袋前。	14			6	避免於開花期施藥。	
番石榴	薊馬類	0.8-1.3 公升	1,600	害蟲發生時開始施藥。	7			7		
桑樹	毒蛾類	0.8-1.6 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			12	勿使用於飼養家蠶之桑樹。	
檬果	夜蛾類	1-2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			12		
檬果	毒蛾類	1-2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			12		
檬果	薊馬類	0.45-1 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			12		
楊梅	夜蛾類	1-2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			12		
楊梅	毒蛾類	1-2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			12		
薔薇科 梨果類	薊馬類	0.3-1.6 公升	1,600	害蟲發生時開始施藥。	7			7		
梨	夜蛾類	1-2 公升	1,000	害蟲發生時開始施	7			6		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
				藥。						
梨	毒蛾類	1-2 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
梨	刺蛾類	1-2 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
梨	中國梨 木蝨	0.5-0.7 公升	2,400	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
蘋果	夜蛾類	1-1.2 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
蘋果	刺蛾類	1-1.2 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
桃	夜蛾類	1-2 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
桃	毒蛾類	1-2 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
桃	刺蛾類	1-2 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
梅	毒蛾類	1.2-1.8 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
李	捲葉蛾 類	0.8-1.7 公升	1,200	害蟲發生 時開始施 藥。	10			7		
李	刺蛾類	1-2 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
枇杷	毒蛾類	1.6-2 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
鼠李科 梨果類	夜蛾類	0.8-1.2 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
鼠李科 梨果類	毒蛾類	0.8-1.2 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
鼠李科 梨果類	薊馬類	0.5-0.8 公升	1,600	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7		
柿	夜蛾類	1-1.2 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
柿	毒蛾類	1-1.2 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
柿	刺蛾類	1-1.2 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
柿	薊馬類	0.6-1 公 升	1,600	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7		
柑桔類	夜蛾類	1-2.4 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
柑桔類	毒蛾類	1-2.4 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
柑桔類	柑桔潛 葉蛾	1 公升	2,000	害蟲發生 時，全株 噴射施藥 1 次。				6		
柑桔類	鳳蝶類	1-2.4 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
柑桔類	刺蛾類	1-2.4 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
柑桔類	薊馬類	0.5-1.2 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
百合	薊馬類	0.2-0.6 公升	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
蓮	薊馬類	0.4 公升	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
茶	夜蛾類	1-3 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
茶	毒蛾類	1-3 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
茶	刺蛾類	1-3 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
茶	小黃薊 馬	0.625 公 升	1,600	萌芽初期 害蟲發生 時施藥。				12		
藍莓	薊馬類	<u>1 公升</u>	<u>2,000</u>	<u>害蟲發生</u> <u>時開始施</u> <u>藥。</u>	<u>7</u>	<u>共 2</u> <u>次</u>		<u>10</u>	<u>避免於開花</u> <u>期施用。</u>	本項新 增。(主管 機關依據 農藥管理 法第 11 條以公務 預算辦理 之田間試 驗)

25(%) (w/w) 賜諾特 水分散性粒劑 (WG)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
十字花科包葉菜類	小菜蛾	0.178-0.267公斤	4,500	害蟲發生時開始施藥。	7			24	1. 採收前18天停止施藥(設施栽培24天)。 2. 避免於開花時使用。	
十字花科小葉菜類	小菜蛾	0.178-0.267公斤	4,500	害蟲發生時開始施藥。	7			12	1. 採收前6天停止施藥(設施栽培12天)。 2. 避免於開花時使用。	
蘿蔔	小菜蛾	0.178-0.267公斤	4,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天再施藥1次。	7			6	避免於開花期施藥。	
蕪菁	小菜蛾	0.178-0.267公斤	4,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天再施藥1次。	7			6	避免於開花期施藥。	
山葵	小菜蛾	0.178-0.267公斤	4,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天再施藥1次。	7			6	避免於開花期施藥。	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
藍莓	薊馬類	0.235 公 斤	8,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2 次		10	避免於開花 期施用。	本項新 增。(主 管機關 依據農 藥管理 法第 11 條以公 務預算 辦理之 田間試 驗)