

## 「待克派滅芬」農藥使用方法及其範圍

中華民國 115 年 8 月 7 日農授防字第 1151877683D 號公告

### 一、新農藥普通名稱一覽表

| 普通名稱  | 英文普通名稱                             | IUPAC/有效成分                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 待克派滅芬 | difenoconazole +<br>pydiflumetofen | (1) 3-chloro-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]phenyl 4-chlorophenyl ether<br>(2) 3-(difluoromethyl)-N-methoxy-1-methyl-N-[(RS)-1-methyl-2-(2,4,6-trichlorophenyl)ethyl]-1H-pyrazole-4-carboxamide |

### 二、「待克派滅芬」農藥使用方法與範圍一覽表

200 g/L(20% w/v) 待克派滅芬 水懸劑(SC)

| 作物名稱            | 病蟲名稱 | 每公頃<br>每次用量 | 稀釋<br>倍數 | 使用時期                | 施藥<br>間隔<br>(天) | 施藥<br>次數  | 施藥<br>方法 | 安全<br>採收<br>期(天) | 注意事項                          | 說明                                           |
|-----------------|------|-------------|----------|---------------------|-----------------|-----------|----------|------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| 西瓜<br>香瓜<br>洋香瓜 | 蔓枯病  | 0.5 公升      | 2,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。 | 7               | 最多 4<br>次 |          | 3                | 使用本藥劑後不可與非本藥劑核准使用範圍輪作，以免蓄積殘留。 | 原始登<br>記廠商<br>名稱：台<br>灣先正<br>達股份<br>有限公<br>司 |