

「甲酸」農藥使用方法及其範圍

中華民國 115 年 8 月 7 日農授防字第 1151877683A 號公告

一、新農藥普通名稱一覽表

普通名稱	英文普通名稱	IUPAC/有效成分
甲酸	Formic acid	methanoic acid

二、「甲酸」農藥使用方法與範圍一覽表

65% 甲酸 蒸散劑(VP)

作物 名稱	病蟲 名稱	每公 頃 每次 用量	稀釋 倍數	使用時 期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期 (天)	注意事項	說明
蜜蜂	蜂蟹蟎			成蜂蜂蟹蟎寄生率 3% 以上。			- 每群蜜蜂(7-9 框)春夏季(或平均溫度高於 28℃)施用 50 克包裝；秋冬季(或平均溫度低於 28℃)施用 25 克包裝。每 7 日施用 1 次，連續施用 3 次。 - 包裝打開後直接置於巢框上方。 - 建議於傍晚外勤蜂歸巢後施藥。 - 搭配禁王斷子或於換王斷子期施用效果更佳。		- 白天氣溫超過攝氏 35 度不建議使用本藥劑，以避免發生失王或逃蜂。 - 甲酸為具揮發性強酸，施用人員應配戴橡膠手套、活性炭口罩操作，並於室外上風處打開藥盒後立即將藥劑放入蜂箱。	原始登 記廠商 名稱：漢 寶工業 有限公 司