

「聚乙醛」農藥使用方法及其範圍

中華民國 115 年 8 月 7 日農授防字第 1151877683F 號公告修正

20(%) (w/w) 聚乙醛 水分散性油懸劑 (OD)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
紅龍果	扁蝸牛	3.75-5 公升	400	田間出現扁蝸牛時開始施藥，全株噴施。	7	共 4 次		3		
紅龍果	扁蝸牛	3.75-5 公升	400	田間出現扁蝸牛時開始施藥，全株噴施。	7	共 4 次		3		

3.25(%) (w/w) 聚乙醛 餌劑 (RB)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
水稻	福壽螺	9 公斤		插秧前 1-3 天或當天。					施藥時田水保持 1-3 公分，約 7 天。施藥當天不排水，以免危害其他水生生物。	
作物園	非洲蝸牛	1 公克/平方公尺								
作物園	蛞蝓	1 公克/平方公尺								
造林地	非洲蝸牛	8.4 公斤		萌芽後。						

6(%) (w/w) 聚乙醛 餌劑 (RB)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
水稻	福壽螺	5 公斤		插秧前 1-3 天或當天。					施藥時田水保持 1-3 公分，約 7 天。施藥當天不排水，以免危害其他水生物。	
作物園	非洲蝸牛	0.54 公克/平方公尺								
作物園	蛞蝓	0.54 公克/平方公尺								
造林地	非洲蝸牛	4.55 公斤		萌芽後。						

80(%) (w/w) 聚乙醛 可溼性粉劑 (WP)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
水稻	福壽螺	1.2 公斤		插秧前。						重複範圍，本項刪除。
水稻	福壽螺	1.2 公斤		插秧前施藥。						
文心蘭	扁蝸牛	1.25 公斤	800	扁蝸牛發生時施藥 1 次。					建議於傍晚施藥。	本項新增。原始登記廠商名稱：漢寶工業有限公司。